

Analizador de Ressonância Magnética Quântica

- Função da Vesícula Biliar

Este é um exemplo de análise de saúde através da bioressonância, fornecido por www.bioanalizador.com.br

Nome: Exemplo(Feminino)

Sexo: Feminino

Idade: 31

Figura: 165cm, 62kg

Período do teste: 16/10/2013 13:10

Column

Resultados reais do teste

Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	Resultado do teste
Globulina do soro sanguíneo (A/G)	126 - 159	139,479	
Bilirrubina total (TBIL)	0,232 - 0,686	0,276	
Fosfatase alcalina (ALP)	0,082 - 0,342	0,202	
Ácido biliar total do soro sanguíneo (TBA)	0,317 - 0,695	0,642	
Bilirrubina (DBIL)	0,218 - 0,549	0,419	

Descrição do parâmetro de teste:

I. Globulina do soro sanguíneo: A/G Faixa saudável: (126~159)

Globulina é o nome que se dá às proteínas insolúveis em água, solúveis em soluções salinas, ácidas ou básicas diluídas, e coaguláveis pelo calor. As proteínas presentes no plasma do sangue são albumina, fibrinogênio e globulinas.

II. Bilirrubina total: TBIL Faixa saudável: (0,232~0,686)

Taxa elevada de bilirrubina total no soro sanguíneo. A bilirrubina eleva-se no soro na presença de lesões hepáticas, obstrução biliar ou quando a velocidade de destruição dos glóbulos vermelhos está aumentada. O aumento da bilirrubina indireta é observado na síndrome hemolítica, na doença de Gilbert. A bilirrubina direta está aumentada nas hepatites agudas e crônicas, nas reações tóxicas a várias drogas e nas obstruções do trato biliar.

III. Fosfatase alcalina: ALP Faixa saudável: (0,082~0,342)

A Fosfatase Alcalina é uma enzima encontrada em praticamente todos os tecidos do corpo, mas que se apresenta sobretudo no fígado, nas vias biliares e nos ossos. Tem diferentes tipos, chamados isoenzimas, que são originárias de diferentes tecidos (FA1 do fígado, FA2 do osso). Estas podem ser quantificadas separadamente caso seja necessário. Os valores de fosfatase alcalina são obtidos numa análise de sangue comum, e sua faixa normal em adultos é de 30 a 140 UI/L (Unidades Internacionais por Litro).

Alguns tumores podem produzir aumento da fosfatase alcalina: pulmonar, testículos, ovários, próstata, pâncreas, colon/reto, gástrico, leucemias.

IV. Ácido biliar total do soro sanguíneo: TBA Faixa saudável: (0,317~0,695)

Os ácidos biliares produzidos pelo fígado atuam diretamente sobre as gorduras como detergentes permitindo a ação das enzimas sobre as gorduras transformando-as em moléculas menores de ácidos graxos e colesterol. Os ácidos biliares combinados com os ácidos graxos e colesterol permitem a passagem das moléculas pequenas através das células do intestino.

V. Bilirrubina: DBIL Faixa saudável: (0,218~0,549)

Bilirrubina Direta (ou conjugada), (solúvel em água) produzida no fígado a partir de bilirrubina indireta

Bilirrubina total e bilirrubina direta são medidas diretamente no sangue, enquanto os níveis de bilirrubina indireta são derivadas das medições de total e bilirrubina direta.

Quando os níveis de bilirrubina estão elevados, a pele e a parte branca dos olhos podem aparecer amarelo (icterícia). Icterícia pode ser causada por doença hepática (hepatite), desordens hematológicas (anemia hemolítica), ou bloqueio dos tubos (ductos biliares), que permitem a passagem de bÍlis do fígado ao intestino delgado.

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.



bioanalizador.com.br
Analisador de Bioressonância Magnética Quântica