

Analizador de Ressonância Magnética Quântica - Sistema Imunológico

Este é um exemplo de análise de saúde através da bioressonância, fornecido por www.bioanalizador.com.br

Nome: Exemplo(Feminino)

Sexo: Feminino

Idade: 31

Figura: 165cm, 62kg

Período do teste: 16/10/2013 13:10

Column

Resultados reais do teste

Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	Resultado do teste
Índice de linfonodo	133,437 - 140,47	135,393	
Índice de imunidade das amígdalas	0,124 - 0,453	0,358	
Índice da medula óssea	0,146 - 3,218	1,311	
Índice do baço	34,367 - 35,642	34,602	
Índice do timo	58,425 - 61,213	55,102	
Índice de imunoglobulina	3,712 - 6,981	3,53	
Índice de imunidade do trato respiratório	3,241 - 9,814	5,629	
Índice de imunidade gastrointestinal	0,638 - 1,712	0,578	
Índice de imunidade da mucosa	4,111 - 18,741	7,644	

Padrão de referência:

Normal(-)
 Moderadamente anormal(++)
 Pouco anormal(+)
 Severamente anormal(+++)

Índice de linfonodo:	133,437-140,47(-) 140,47-146,926(+) 146,926-153,164(++)	140,47-146,926(+) >153,164(+++)
Índice de imunidade das amígdalas:	0,124-0,453(-) 0,073-0,097(++)	0,097-0,124(+) <0,073(+++)
Índice da medula óssea:	0,146-3,218(-) 0,052-0,089(++)	0,089-0,146(+) <0,052(+++)
Índice do baço:	34,367-35,642(-) 29,947-33,109(++)	33,109-34,367(+) <29,947(+++)
Índice do timo:	58,425-61,213(-) 52,518-55,627(++)	55,627-58,425(+) <52,518(+++)
Índice de imunoglobulina:	3,712-6,981(-) 1,571-2,476(++)	2,476-3,712(+) <1,571(+++)

Índice de imunidade do trato respiratório:	3,241-9,814(-)	2,174-3,241(+)
	1,029-2,174(++)	<1,029(+++)
Índice de imunidade gastrointestinal:	0,638-1,712(-)	0,434-0,638(+)
	0,218-0,434(++)	<0,218(+++)
Índice de imunidade da mucosa:	4,111-18,741(-)	2,647-4,111(+)
	1,138-2,647(++)	<1,138(+++)

Descrição do parâmetro
Índice de linfonodo: Linfonodos são órgãos exclusivos dos mamíferos. Os linfonodos superficiais de pessoas normais são pequenos, com diâmetro menor que 0,5 cm, superfície lisa, suave, sem adesão com os tecidos em volta e sem dor quando há pressão. Quando as bactérias entram no corpo por meio do local lesionado, os linfócitos produzem linfocinas e anti-corpos, que matarão tais bactérias. Como resultado, a reatividade dos linfócitos e das células dos tecidos dos linfonodos aumenta, levando à hiperplasia dos linfonodos, processo que se chama por hiperplasia reativa dos linfonodos. Alguns vírus, certos químicos, produtos tóxicos do metabolismo, degeneração dos componentes dos tecidos e corpos estranhos também são capazes de gerar a hiperplasia reativa dos linfonodos. Deste modo, os linfonodos que passaram por hiperplasia são os sentinelas do organismo, um dispositivo de alerta.
Índice de imunidade das amígdalas: As amígdalas são os maiores tecidos linfóides da faringe. Durante a infância, é um órgão imunológico ativo, contendo todos os linfócitos dos estágios de desenvolvimento, tais como células T, células B, fagócitos etc. Assim, possui função imunológica dos fluidos corporais, criando as mais diversas imunoglobulinas, além de ter certa função imunológica celular. A capacidade imunológica da imunoglobulina Iga criada pelas amígdalas é muito forte, podendo impedir a adesão de bactérias na mucosa respiratória, além de inibir o crescimento e multiplicação de bactérias, servindo também para neutralizar e controlar vírus.
Índice da medula óssea: A medula óssea é o tecido do corpo humano responsável por criar o sangue, estando localizada dentro de vários ossos do corpo. A medula óssea de pessoas adultas se divide em: medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A medula óssea vermelha é capaz de criar hemácias, plaquetas e leucócitos. As plaquetas possuem a função de estancar o sangue, os leucócitos podem controlar e matar toda sorte de patógenos, incluindo bactérias, vírus etc. Alguns linfócitos são capazes de criar anti-corpos. Assim, a medula óssea não apenas é um órgão que fabrica o sangue, ainda é um importante órgão imunológico.
Índice do baço: O baço é o maior órgão do corpo linfóide, estando localizado no abdômen superior esquerdo. A função principal do baço é de filtração e de armazenamento de sangue. O baço tem uma textura delicada e uma rica circulação de sangue. Deste modo, tão logo receba um forte golpe externo, é muito fácil para o mesmo ser rompido, o que pode causar hemorragia grave, sendo uma das emergências do abdômen que podem levar à morte.
Índice do timo: O timo é um importante órgão linfóide. Sua função tem relação estreita com a defesa do organismo, secretando o hormônio do timo e demais substâncias hormonais, configurando-se portanto como um órgão com função endócrina. Localiza-se no mediastino anterior do peito. Durante a fase embrionária final e no início do nascimento, o timo pesa de 10 a 15 g, sendo a fase da vida em que tem o maior peso relativo. De acordo com a passagem dos anos, o timo continua a se desenvolver, chegando a ter de 30 a 40 g na juventude. Depois disto, o timo começa a delcinar, os linfócitos diminuem, o tecido adiposo aumenta, voltando a ter apenas 15 g quando se chega à velhice.

Índice de imunoglobulina:

A imunoglobulina é uma proteína animal que age como anti-corpo. Encontra-se principalmente no plasma, mas também é visto em outros fluidos corporais, tecidos e secreções. A maior parte da imunoglobulina presente no plasma humano encontra-se nas globulinas?. A imunoglobulina pode ser dividida em cinco tipos: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE.

Índice de imunidade do trato respiratório:

O sistema respiratório humano é a principal porta de acesso ao mundo exterior. Os microrganismos patogênicos e substâncias nocivas entram no trato respiratório com o ar, conduzindo frequentemente a doenças inflamatórias. No sistema respiratório inteiro, da nasofaringe aos bronquíolos respiratórios e alvéolos, há tecidos linfóides, de modo linfonodos clássicos encontram-se em volta da traquéia e dos brônquios.

Índice de imunidade gastrointestinal:

Nos últimos anos, com o desenvolvimento da imunologia, as pessoas tem prestado cada vez mais atenção ao relacionamento entre as doenças do trato digestivo e imunológico. A imunidade não-específica do trato digestivo inclui: barreira mucosa do trato digestivo, da boca até o reto, as enzimas de decomposição, bilis, barreira do fígado, peristaltismo gastrointestinal e a flora natural.

Índice de imunidade da mucosa:

O sistema imunológico da mucosa é relativamente independente do sistema imunológico sistêmico, mas ao mesmo tempo é inseparável deste. A imunidade da mucosa consiste de duas grandes áreas funcionais: parte de indução de imunidade e a parte de resposta de imunidade correspondente. Os linfócitos do sistema imunológico da mucosa e do sistema imunológico do corpo se movem sem parar entre as duas grandes áreas funcionais, ao mesmo tempo em que ocorre a sua diferenciação e maturação.

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.