

Analizador de Ressonância Magnética Quântica - Alérgenos

Este é um exemplo de análise de saúde através da bioressonância, fornecido por www.bioanalizador.com.br

Nome: Exemplo(Feminino)

Sexo: Feminino

Idade: 31

Figura: 165cm, 62kg

Período do teste: 16/10/2013 13:10

Column

Resultados reais do teste

Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	Resultado do teste
Índice de alergia a medicamentos	0,431 - 1,329	1,183	
Índice de alergia álcool	0,432 - 1,246	1,688	
Índice de alergia ao pólen	0,143 - 1,989	1,788	
Índice de alergia antibióticos	0,847 - 1,045	1,08	
fibra química	0,842 - 1,643	2,628	
Alergia a tintas e vernizes	0,346 - 1,401	1,458	
Índice de alergia a poeira	0,543 - 1,023	1,202	
Índice de alergia a fumos	0,826 - 1,013	1,605	
Alergia a corante de tintas cabelo	0,717 - 1,486	2,406	
Índice alergia de contato	0,124 - 1,192	1,727	
Alergia a acessórios de metal	0,549 - 1,213	1,079	
Índice alergia marisco	0,449 - 1,246	1,563	
Índice alergia proteína do leite	0,477 - 1,348	3,043	

Padrão de referência:

Normal(-)
 Moderadamente anormal(++)

Pouco anormal(+)
 Severamente anormal(+++)

Índice de alergia a medicamentos:

0,431-1,329(-)

1,329-2,227(+)

2,227-5,219(++)

>5,219(+++)

Índice de alergia álcool:

0,432-1,246(-)

1,246-2,462(+)

2,462-5,663(++)

>5,663 (+++)

Índice de alergia ao pólen:

0,143-1,989(-)

1,989-2,843(+)

2,843-5,945(++)

>5,945(+++)

Índice de alergia antibióticos:

0,847-1,045(-)

1,045-1,847(+)

1,847-2,663(++)

>2,663(+++)

fibra química:	0,842-1,643(-) 2,721-3,943(++)	1,643-2,721(+) >3,943(+++)
Alergia a tintas e vernizes:	0,346-1,401(-) 2,346-4,311(++)	1,401-2,346(+) >4,311(+++)
Índice de alergia a poeira:	0,543-1,023(-) 1,543-2,872(++)	1,023-1,543(+) >2,872(+++)
Índice de alergia a fumos:	0,826-1,013(-) 2,826-4,213(++)	1,013-2,826(+) >4,213(+++)
Alergia a corante de tintas cabelo:	0,717-1,486(-) 2,717-5,541(++)	1,486-2,717(+) >5,541(+++)
Índice alergia de contato:	0,124-1,192(-) 2,124-4,369(++)	1,192-2,124(+) >4,369(+++)
Alergia a acessórios de metal:	0,549-1,213(-) 2,549-3,229(++)	1,213-2,549(+) >3,229(+++)
Índice alergia marisco:	0,449-1,246(-) 2,844-4,325(++)	1,246-2,844(+) >4,325(+++)
Índice alergia proteína do leite:	0,477-1,348(-) 4,477-8,742(++)	1,348-4,477(+) >8,742(+++)

Descrição do parâmetro
Índice de alergia a medicamentos: A alergia a componentes de medicamentos e certos tipos de drogas. A reação alérgica é um tipo da resposta imunológica anormal. A falta de resposta imune, ou é forte ou excessivamente fraco, e no organismo pode causar uma série de mudanças patológicas ; Este tipo da situação causa intoxicação no organismo e podem causar alterações no sangue e na pele revelando:, comichao ,palpitações, erupções na pele, a dificuldade da respiração e que a ser séria pode causar choque anafilático ou a morte.
Índice de alergia álcool: As bebidas alcoólicas podem desencadear reações alérgicas ou agravar alergias existentes, alertam os especialistas. Embora raras, algumas pessoas tem alergias ao álcool em si, enquanto outras são alérgicas a várias substâncias presentes nas bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho. Os sintomas podem incluir vermelhidão na pele, coceira nos olhos, congestão nasal, dor de estômago e dificuldade respiratória. Essas reações alérgicas podem ser provocadas por vários ingredientes da cerveja e do vinho, incluindo cevada, o etanol, uva, malte, lúpulo, o trigo e também o fermento. Outros potenciais alérgenos são por vezes adicionados durante o processamento, incluindo ovos brancos, que podem ser utilizados durante o processo de filtragem e sulfitos, que ocorrem naturalmente no vinho, mas também pode ser adicionado como conservante. Todos esses ingredientes podem liberar uma série de reações alérgicas em pessoas que apresentam essa pré-disposição.
Índice de alergia ao pólen: O grão de pólen é a célula masculina necessária para a propagação da semente das plantas. É produzido por uma planta e depois transportado por um insecto ou pelo vento para polinizar (fertilizar) outra. São partículas de tamanho muito reduzido (em média de 0,016 a 0,060 mm), como se fosse um pó, geralmente invisíveis a olho nu e provenientes de gramíneas, ervas daninhas, árvores e flores. Apesar da imensa variedade de vegetais existente, apenas cerca de 10%

das espécies existentes são incriminadas como fontes de alergia. Ao contrário do que se possa pensar, os grãos de pólen das espécies que têm flores e folhas vistosas, como as rosas, os crisântemos e outras, são os que menos causam problemas alérgicos. Isto porque são pesados, grandes, quase só transportáveis por insectos, como a abelha, de quem, aliás, dependem para a sua reprodução. Só nas pessoas que lidam muito de perto com eles, como os jardineiros e as floristas, é que podemos vir a encontrar alergias a este tipo de pólen. Os grandes responsáveis pelas alergias são das espécies das gramíneas, ervas daninhas e árvores, as quais obedecem a determinadas características: produzem enormes quantidades de grãos de pólen e estes são leves, facilitando o seu transporte pelo vento, através do qual é feita a sua reprodução, e suficientemente pequenos para poderem penetrar no nosso aparelho respiratório. O transporte dos pólenes pode fazer-se até grandes distâncias, como 100 Km, mas habitualmente, a maioria provem de plantas que estão situadas até 1 Km do local em que se encontra o doente. Através de aparelhos e técnicas apropriados é possível fazer contagens de pólenes ao longo do ano e com periodicidade variável, que permitem elaborar calendários polínicos. É também possível fazer previsões da 'chuva' polínica para os dias imediatos. As contagens avaliam a quantidade de grãos de pólen que existem num metro cúbico de ar. Uma contagem inferior a 50 é considerada baixa e uma superior a 200 é muito alta. Em Portugal, já foram elaborados calendários polínicos em várias regiões e as espécies mais vulgarmente implicadas são as gramíneas ('ervas rasteiras', a que pertencem os fenos e os cereais), as ervas daninhas (parietária e plantago) e, numa pequena percentagem dos doentes, as árvores (oliveira, plátano, bétula, cipreste, etc.).

Índice de alergia antibióticos:

Alergias a medicamentos, ou um medicamento, como por exemplo a penicilina, pode causar reacções por vários destes mecanismos. As vezes estes estão interligados, demonstrando a complexidade da alergia medicamentosa. Nem sempre se conhece como um remédio causa reacções adversas e, então, se usa o termo idiossincrasia. As quatro categorias de reacções alérgicas são: reacções mediadas por anticorpos alérgicos (IgE), reacções por anticorpos anti celulares (IgG), reacções por imuno complexos (antígeno-anticorpos) e, finalmente as reacções imunológicas tardias mediadas por células.

fibra química:

O material cru ou químico da fibra da roupa oriundas do carvão, do petróleo, do composto molecular do contorno do gás natural ou retira-se incluindo o composto do nitrogênio dentro, em que algumas variedades se transformam muito possivelmente a fonte alérgica, incorpora o organismo, e é muito fácil de causar a dermatite alérgica cujas causas que o são comichão o acne, vermelhão ou a bolha.

Alergia a tintas e vernizes:

Os produtos da classe das tintas podem causar reacções alérgicas em algumas pessoas. Mas esta aparência do sintoma é não necessariamente qualificada em consequência da qualidade mas sim da característica da pessoa. A alergia da pintura pode principalmente causar dois sintomas. 1º, a rinite alérgica, coceira no nariz, espirros, um pouco fluido água pelo nariz, náuseas. 2º dermatite alérgica no corpo podendo causar comichão.

Índice de alergia a poeira:

A alergia a poeiras, pode causar dificuldades na respiração podendo causar comichão no nariz, na pele, nos olhos, similaridade com asma ou outras dificuldades e assim por diante. Quando se sofre de asma pode ter de ser socorrido pelo hospital.

Índice de alergia a fumos:

Alergia a fumos relaciona-se com alergia respiratória. Pode causar corrimento nasal, mucos, comichão, acne, erupções cutâneas. Evitar ambientes de fumo.

Alergia a corante de tintas cabelo:

A alergia a algumas tintas do cabelo pode desencadear comichão cabeça, sensação de ardor doloroso, inchaço da cara e garganta e até mesmo supuração e infecção. Um dos ingredientes 'ursol' facilmente causa danos na pele. como bolhas purulentas. Pode causar danos no corpo também.

Índice alergia de contato:

A alergia superficial a animais e alergias de contato. Ao contacto com alguns animais pode ter o sintoma alérgico como comichão nariz, pele, olhos, tosse e falta de ar e nos asmáticos acentua-se o sintoma.

Alergia a acessórios de metal:

Nos acessórios metálicos como bijuteria e outros devido a proporção de níquel, o cobre, o cromo e assim por diante aumenta a sensibilidade na pele como a transpiração, e a expansão capilar do sangue causada pelos acessórios de metal através dos poros e das glândulas sebáceas.

Índice alergia marisco:

A alergia é porque os mariscos incluem proteínas heterogêneas maciças, estas proteínas heterogêneas diretamente ou ativam o sistema imune indiretamente, causando uma química de libertação média, e uma série de reação bioquímicas complexas . O corpo que ingere o antígeno liberta toxina e causa reacção alérgica que pode ser de moderada a grave.

Índice alergia proteína do leite:

Sintomas de alergia ao leite podem ser:diarreia, prisão de ventre, cólicas , diarreia ,refluxo, vomito, coceira, vermelhidão, emagrecimento e urticária. Na alergia ao leite o humano rejeita a proteína do leite o que é diferente da intolerância a lactose.

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.



bioanalizador.com.br
Analisador de Bioressonância Magnética Quântica