

Analizador de Ressonância Magnética Quântica - Olhos

Este é um exemplo de análise de saúde através da bioressonância, fornecido por www.bioanalizador.com.br

Nome: Exemplo(Feminino)

Sexo: Feminino

Idade: 31

Figura: 165cm, 62kg

Período do teste: 16/10/2013 13:10

Column

Resultados reais do teste

Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	Resultado do teste
Bolsas sob os olhos	0,510 - 3,109	3,106	
Colágeno das rugas nos olhos	2,031 - 3,107	2,42	
Pigmentação da pele (índice de olheiras)	0,831 - 3,188	6,279	
Obstrução linfática	1,116 - 4,101	1,144	
Afrouxamento e queda	0,233 - 0,559	0,55	
Edema	0,332 - 0,726	1,295	
Atividade das células dos olhos	0,118 - 0,892	0,846	
Fadiga visual	2,017 - 5,157	8,47	

bioanalizador.com.br
Analizador de Bioressonância Magnética Quântica

Padrão de referência:

	Normal(-)		Pouco anormal(+)
	Moderadamente anormal(++)		Severamente anormal(+++)

Bolsas sob os olhos:	0,510-3,109(-) 7,285-9,729(++)	3,109-7,285(+) >9,729(+++)
Colágeno das rugas nos olhos:	2,031-3,107(-) 0,486-1,107(++)	1,107-2,031(+) <0,486(+++)
Pigmentação da pele (índice de olheiras):	0,831-3,188(-) 5,615-8,036(++)	3,188-5,615(+) >8,036(+++)
Obstrução linfática:	1,116-4,101(-) 7,348-9,907(++)	4,101-7,348(+) >9,907(+++)
Afrouxamento e queda:	0,233-0,559(-) 1,066-1,549(++)	0,559-1,066(+) >1,549(+++)
Edema:	0,332-0,726(-) 1,226-1,708(++)	0,726-1,226(+) >1,708(+++)
Atividade das células dos olhos:	0,118-0,892(-)	0,892-1,37(+)

	1,37-1,892(++)	>1,892(+++)
Fadiga visual:	2,017-5,157(-)	5,157-8,253(+)
	8,253-10,184(++)	>10,184(+++)

Descrição do parâmetro
Bolsas sob os olhos: As bolsas sob os olhos é causada pelo relaxamento da pele do rosto, do tecido subcutâneo, da musculatura e do septo orbital. O excesso de gordura no pós-orbital causa a protuberância em forma de bolsa.
Colágeno das rugas nos olhos: As rugas são depressões que aparecem primeiramente na região dos olhos e são originadas devido a problemas no comportamento das fibras de colágeno e elastina. As linhas de expressão são linhas que se formam com gestos ou expressões repetitivas.
Pigmentação da pele (índice de olheiras): As olheiras ocorrem devido noites sem dormir, instabilidade emocional, fadiga ocular, envelhecimento, lentidão do sangue venoso, fornecimento de oxigênio para as hemoglobinas da pele da área dos olhos insuficiente, acúmulo excessivo de dióxido de carbono venoso e resíduos metabólicos causam hipoxia crônica, escurecimento do sangue, estagnação e escurecimento da área dos olhos.
Obstrução linfática: A artéria retiniana é o maior vaso que fornece sangue à retina. Se estiver entupida, o olho afectado perde subitamente a visão, embora sem dor. A obstrução pode dever-se à aterosclerose, a um coágulo de sangue ou a um glóbulo de gordura (em geral, gordura que escapou da medula óssea depois de uma fractura. Outra causa importante, em especial nas pessoas de idade, é a inflamação dos vasos sanguíneos da cabeça (arterite temporal). É necessário começar de imediato um tratamento para preservar a visão.
Afrouxamento e queda: O afrouxamento e a queda são causados pela degeneração das fibras entre as células, o que faz com que a pele perca elasticidade. A perda da gordura subcutânea faz com que a pele perca o suporte e desça. O afrouxamento da musculatura subcutânea também faz a pele ficar frouxa.
Edema: O edema ocorre por causa da má circulação do sangue, impossibilidade de eliminar todo o excesso de água a tempo, estagnação da água em microtratamento, e até mesmo por reinfilhação na pele, causando o inchaço mesmo a nível ocular
Atividade das células dos olhos: Acuidade visual (AV) é uma característica do olho de reconhecer dois pontos muito próximos. Vários fatores especificam a esta acuidade, em especial, a distância entre os fotorreceptores na retina e também da precisão da refração. Ela é determinada pela menor imagem retiniana percebida pelo indivíduo. Sua medida é dada pela relação entre o tamanho do menor objeto (optotipo) visualizado e a distância entre observador e objeto. A diminuição da acuidade visual causa importante déficit (défice) funcional e considerável morbidade a seus portadores. Seu reconhecimento é importante, pois na maior parte das vezes tal deficiência pode ser corrigida com terapêutica adequada. A acuidade visual pode ser medida através de escalas optótipos
Fadiga visual: Fadiga visual indica o cansaço dos olhos causado pelo uso excessivo da visão de perto ao trabalhar ou estudar. Ocorre facilmente em pessoas de constituição física fraca, que se dediquem a trabalhos que envolvem o uso da visão de perto, trabalhem muito com o computador ou em ambientes com iluminação insuficiente, bem como em pessoas com miopia, hipermetropia, presbiopia. Os sintomas comuns de tais pacientes são: perda de nitidez quando se focaliza um objeto por um certo

período, incapacidade de escrever ou ler, secura nos olhos, dor de cabeça e, quando grave, enjoo e vômito.

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.



bioanalizador.com.br
Analisador de Bioressonância Magnética Quântica